Informationen des LÜVA Mittelsachsen zur Frühjahrsschulung 2025

Tierseuchen / Tierschutz / Tierarzneimittel / Lebensmittel

Lebensmittel – kein Verstoß

	11
Risikoauswahl	5
Zufallsauswahl	2
wegen Zuständigkeit	3
Anlass	1

Tierische Lebensmittel	10
Milch	1
Eier	1
Pflanzliche Lebensmittel	2

Lebensmittel

- Abgabe zur Schlachtung während der Wartezeit
- Fehlende oder unzureichende Aufzeichnungen über durchgeführte Tierarzneimittelbehandlungen (Bestandsbuch) = behandelte Tiere nicht eindeutig identifizierbar
- Fehlende Aufzeichnungen zur Rückverfolgbarkeit der Tiere = Bestandsregister
- Abgabe von Kolostrum bzw. Milch zur Lebensmittelherstellung während der Wartezeit

Tierschutz

	Kälber	Schweine	Landw. Nutztiere
Risikoauswahl	1	1	7
Zufallsauswahl			2
wegen Zuständigkeit			1
Anlass			1

Kontrollierte Tiere	
Schweine	5
Kälber	105
Rinder	593
Legehennen	21
Masthähnchen	82487

1 Verstoß gegen RL 98/58/EG landwirtschaftliche Nutztiere
 3 % Abzug – fahrlässiger Erstverstoß
*Spaltenböden im Jungviehstall verschlissen,
 Vorfall: Am 26.04.2024 10 Jungrinder über die
 Spaltenelemente in den Güllekanal eingebrochen. Davon 4
 tote Rinder und 3 weitere eingeschläfert.*

➤ Tränken und Futter

Jederzeit Versorgung mit Tränkwasser in entsprechender Qualität

➤ Einzelhaltung Kälber

Durchbrochene Seitenwände mind. 25x10 cm in Kopfhöhe

Einzelhaltung eine Box bis 2. LW, die innen mindestens 120 x 80 x 80 cm

Ab 3. LW bis 8. LW Einzelhaltung 160-180 x 90-100 cm

>8.LW in Gruppen

➤ Witterungsschutz bei Weidehaltung

Witterungsabhängig – Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung, Dauernässe, Wind, Kälte

Natürlich (Hecken, Bäume, Büsche, Waldungen) ganztägig wirksam, bei ganzjähriger

Weidehaltung auch ganzjährig wirksam oder künstlich, für alle Tiere ausreichend

➤ **Maßnahmen bei kranken/verletzten Tieren, Hinzuziehen Tierarzt**

Nachweise zur Behandlung der Tiere

Ursachenabklärung bei ungeklärten Todesfällen = Sektion, Proben

➤ Liegebereich Beschaffenheit

Regelmäßige Entmistung und Einstreu – Verschmutzung vermeiden (Tierschutz und Lebensmittelhygiene)

Elastischer Liegeplatz Kälber

➤ Beleuchtung

Angemessene Lichtstärke, mind. 80 Lux bei Kälbern

➤ Mängelkontrolle mind. 1x täglich

Zustand der Haltungseinrichtungen hinsichtlich Verletzungsgefahren, Bewegungseinschränkung, Möglichkeit Reinigung

Platzbedarf entsprechend Nutztierhaltungs-VO beachten

➤ Eingriffe / Amputationsverbot außer

- Enthornen oder das Verhindern des Hornwachstums bei **unter sechs Wochen alten Rindern** wenn der Eingriff im Einzelfall für die vorgesehene Nutzung des Tieres zu dessen Schutz oder zum Schutz anderer Tiere unerlässlich ist
- Kastrieren **von unter vier Wochen** alten männlichen Rindern, Schafen und Ziegen
- Kürzen des Schwanzes **von unter vier Tage** alten Ferkeln sowie von unter acht Tage alten Lämmern

Neue Förderperiode = Konditionalität

- Kennzeichnung Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine nicht Bestandteil der Konditionalitätskontrollen aber
- Rückverfolgbarkeit Bestandteil der Kontrollen Lebensmittel und Tierschutz
- Kennzeichnungskontrollen durch LfULG im Rahmen Mutterschaf- bzw. Mutterkuhprämie
- Weiterhin Fachrechtskontrollen Kennzeichnung Rinder, Schafe, Ziegen durch LÜVA bei 3% der Tierhalter des Landkreises nach vorgegebener Auswahl

Fachrechtskontrollen		ohne Beanstandung	mit Beanstandung
Rind	39	31	8
Schaf/Ziege	103	61	42

Kontrollpunkte Rind

- Kennzeichnung
- Bestandsregister
- HIT-Datenbank

Kontrollpunkte Schaf/Ziege

- Kennzeichnung
- Bestandsregister
- HIT-Datenbank (Übernahme- und Stichtagsmeldungen)
- Begleitpapiere

Pest der kleinen Wiederkäuer

- Griechenland seit Beginn des Seuchenzuges im Juli 2024 Ausbrüche in sechs Regionen
- Rumänien
- In beiden Ländern werden Bekämpfungsmaßnahmen gemäß Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 getroffen.
- Genomanalysen bestätigen, dass das Auftreten von PPR in Griechenland und Rumänien einen gemeinsamen Ursprung hat und dass das Virus mit Stämmen verwandt ist, die 2016 in Nord- und Ostafrika sowie in Georgien zirkulierten
- Seit Ende Januar 2025 bisher **3 Ausbrüche in Ungarn** durch Einschleppung aus Rumänien
- März 2025 weitere Ausbrüche in Rumänien

Schaf- und Ziegenpocken (SZP)

- Griechenland
- Bulgarien

HPAI

wild lebendes Tier	gehaltenes Tier
Aktive Fälle	Aktive Fälle
9	15
Feststellungen dieses Jahr	Feststellungen dieses Jahr
227	21

Afrikanische Schweinepest (Genotyp II) in Europa 2025

Quelle: ADIS, TSN (Stand: 19.03.2025 - 09:25 Uhr)

(Angabe der Anzahl der gemeldeten Ausbrüche/Fälle vom Stand: 11.03.2025 - 16:45 Uhr in Klammern)

ASP

Europa

	Hausschweine	Wildschweine	Gesamt
Albanien	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Bosnien u. Herzegowina	6 (6)	12 (12)	18 (18)
Bulgarien	0 (0)	259 (259)	259 (259)
Deutschland	0 (0)	799 (700)	799 (700)
Estland	0 (0)	22 (21)	22 (21)
Griechenland	0 (0)	54 (47)	54 (47)
Italien	1 (1)	186 (170)	187 (171)
Kosovo	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Kroatien	1 (1)	6 (6)	7 (7)
Lettland	0 (0)	445 (409)	445 (409)
Litauen	0 (0)	223 (170)	223 (170)
Moldawien	27 (23)	4 (4)	31 (27)
Montenegro	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Nordmazedonien	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Polen	0 (0)	1.156 (1100)	1.156 (1100)
Rumanien	88 (84)	81 (80)	169 (164)
Schweden	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Serbien	11 (11)	12 (12)	23 (23)
Slowakei	0 (0)	90 (85)	90 (85)
Tschechien	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Ukraine	11 (10)	15 (12)	26 (22)
Ungarn	0 (0)	355 (332)	355 (332)
Gesamt	145 (136)	3.719 (3419)	3.864 (3555)

ASP Deutschland

Quelle: Lagebesprechung LTbZ 04.03.2025

ASP - Ausbrüche pro Monat - im Zeitverlauf

WNF

2024:
Pferd: 204
Vögel 84

Erfasste und bestätigte Fallzahlen der Jahre 2020–2023

Jahr	2020	2021	2022	2023
Pferde	22	19	17	18
Wild- und Zoovögel	65	34	54	25

Nachweis von WNV bei Vogel + Pferd 2024

MKS

BB/Berlin

- 10.01. – Ausbruch MKS in einer Büffelherde in BB (14 Tiere)
- 13.02. – Aufhebung der Schutzzone (alle Betriebe dreimal untersucht/beprobt)
- 25.02. – Aufhebung der Überwachungszone (alle Betriebe zweimal untersucht/beprobt)
- 25.02. – Inkrafttreten einer weiteren Sperrzone – „Containment Zone“ (6-km-Radius, Betriebe werden weiter verstärkt amtlich untersucht)
- 15.03.2025 – Deutschland wieder MKS frei
- Epidemiologische Ermittlungen abgeschlossen: am wahrscheinlichsten ist die Einschleppung über infizierte Lebensmittel durch den Menschen

Sachsen

- MKS-Surveillance in Sachsen –Virologie: 325; Serologie: 180 alle mit negativem Ergebnis

MKS

Ungarn

- 07.03.2025 MKS-Ausbruch in einem Bestand mit 1.418 Milchkühen im Komitat Győr-Moson-Sopron nahe der Grenze zur Slowakei
- Zweiter Ausbruch 40km entfernt Milchviehbetrieb mit 3000 Kühen, Tötung und vergraben
- Dritter und vierter Ausbruch = Kontaktbetriebe über TKBA Fahrzeug

Slowakei

- 1.-3. Fall: am 21.03.2025 an Grenze zu Ungarn Rinderbetriebe mit jeweils 670-1300 Rindern
- 4. und 5. Fall: Jerseymilchfarm oberhalb von Bratislava mit >3000 Rindern = Personenkontakte zum 2. fall in Ungarn
- 6. Ausbruch 05.04.2025 Region an ungarischer Grenze

Österreich

- Überwachungszonen reichen bis nach Österreich
- Maßnahmen zur Verhinderung Einschleppung eingeleitet = Grenzschießungen, vermehrte Probenahmen

Deutschland BTV3

Feststellungen vom 01.05.2024 - 30.04.2025

Quelle: <https://tsis.fli.de/>

Feststellungen 1.680 dieses Jahr	Feststellungen 17.475 01.05.2024 - 30.04.2025	Feststellungen 218 diesen Monat	Aktive Sperrzonen 0
---	---	--	-------------------------------

Feststellungen der letzten 12 Monate

Landkreis Mittelsachsen

Erfahrungen:

- bisher keine Impfnebenwirkungen gemeldet
- Geimpfte Bestände bisher kaum Klinik
- Sowohl bei Mutterkühen als auch bei Milchvieh **Aborte, blinde Kälber, Anstieg Kälberverluste**
- Tiere erkranken sehr stark an Sekundärinfektionen die im Bestand vorhanden sind
- Schafe sterben zu überwiegenden Teilen an der Infektion wenn nicht geimpft
- Meldungen von Jägern zu vermehrt toten Muffelwild

Empfohlene Biosicherheitsmaßnahmen

1. Kein Betreten der Tierhaltungen durch unbefugte Personen (**Tore schließen**, Warnschild)
2. Abriegelung der Tierbestände vor dem Zugang durch andere Haus- oder Wildtiere (**viehdicke Einzäunung** bei großen Tierhaltungsanlagen, verschlossene Ställe)
- 3. Zugang zu den Tierhaltungen nur in betriebseigener Kleidung** bzw. Einwegschutzkleidung (z.B. Tierarzt, Viehhändler, Klauenpfleger, Besamer, Futtermittelberater, Techniker)
4. Übergabe verendeter Tiere an die Tierkörperbeseitigung nur an der Betriebsgrenze ohne Befahren der Tierhaltungsanlagen, keine sich kreuzenden Fahrtwege mit betriebsinternen Fahrzeugen
5. Zukäufe von Tieren vermeiden, wenn notwendig Quarantäne von 30 Tagen
6. Keine Verwendung von Geräten zusammen mit anderen Tierhaltern ohne vorherige Reinigung und Desinfektion (z.B. Behandlungsstand, Viehhänger)
7. Übergabe von Tieren an Viehhändler etc. möglichst an der Betriebsgrenze ohne Befahren der Tierhaltungsanlage
- 8. Striktes Schwarz-Weißprinzip = Betreten der Ställe und Weiden nur in Kleidung und mit Schuhwerk was im Betrieb verbleibt und nicht außerhalb der Tierhaltung getragen wird**
9. Kein Zugang für Jagdhunde zu den Tierhaltungen
10. Möglichst keine Teilnahme an Ausstellungen etc., bei Teilnahme strikte Quarantäne für 30 Tage
- 11. Sofortige tierärztliche Abklärung bei Krankheiten oder plötzlichen Todesfällen im Bestand**
12. Verzichten Sie zum Schutz der heimischen Klautiere auf Mitbringsel wie Wurst, Fleisch oder Trophäen von Klautieren aus dem Urlaub im Ausland
13. Verfüttern Sie niemals Küchenabfälle oder Essensreste an Klautiere!

Achtung!!!

Bei Abklärung klinischer Symptome an alle Tierseuchen denken!

Auf dem Untersuchungsbefund alle Tierseuchen angeben die abgeklärt werden sollen!

bei toten Tieren = Sektion!!!!

Meldung von klinischen Verdachtsfällen umgehend im LÜVA

BHV1 Überwachung

gemischte Betriebe < 30% lakt. Tiere im Kuhanteil	1 x jährliche Stichprobe von 10% Zielprävalenz / 95% Sicherheit nach Risikobeurteilung vom LÜVA unter Beachtung des serologisch-neg. BHV 1- Einzeltierstatus
Mutterkuhbetriebe	1x jährlich innerbetrieblichen Zufallsstichprobe (10% Zielprävalenz/ 95% Sicherheit /29 Tiere) nach Risikobeurteilung des LÜVAs
Spezialisierte Jungtieraufzuchten (Fresser- und Färsenaufzuchten)	mittels einer 2x jährlichen innerbetrieblichen Zufallsstichprobe (20% Zielprävalenz/ 95% Sicherheit)
Mastbetriebe	nach Risikobeurteilung LÜVA

Landkreise und kreisfreie Städte	Anzahl Rinderhaltungen	Prozentualer Anteil der Rinderhaltungen	Anzahl der zu untersuchenden Rinderhaltungen außer Milchviehbetriebe
Leipzig, Stadt	24	0,4	3,0
Dresden, Stadt	55	0,85	6,0
Chemnitz, Stadt	66	1,02	8,0
Nordsachsen	401	6,18	47,0
Leipzig Land	443	6,83	50,0
Meißen	461	7,10	50,0
Görlitz	526	8,11	60,0
Vogtlandkreis	587	9,05	67,0
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	637	9,82	72,0
Zwickau	646	9,96	73,0
Bautzen	773	11,91	88,0
Erzgebirgskreis	861	13,27	98,0
Mittelsachsen	1.009	15,55	115,0
Sachen gesamt			737,0

Kontakt

Dr. Anke Kunze

Fachdienstleiterin Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Landratsamt Mittelsachsen

Tel.: 03731 799 6231

E-Mail: lueva@landkreis-mittelsachsen.de